

comprimido de cloreto de bethanecol com 25 mg

Nome da medicação

Nome genérico: **Bethanechol - Oral**

Marca (s) comum (s): Urecholine

Usos

Este medicamento é usado para tratar certos problemas da bexiga, como a incapacidade de urinar ou esvaziar completamente a bexiga devido a certas circunstâncias (por exemplo, cirurgia, problemas musculares da bexiga). Isso funciona ajudando os músculos da bexiga a se contraírem melhor, melhorando sua capacidade de urinar.

Outros usos

Esta seção inclui os usos deste medicamento que não são mencionados nas indicações autorizadas, mas que seu profissional de saúde pode dizer. Use este medicamento para tratar qualquer uma das condições listadas nesta seção somente se seu profissional de saúde lhe disser que o faça. Este medicamento também pode ser usado para tratar a queimação de azia. Isso funciona ajudando os músculos do estômago a esvaziar o conteúdo do estômago mais rapidamente e aumentando a força do músculo que conecta o esôfago com o estômago (esfíncter esofágico inferior). Isso ajuda a evitar que o alimento / ácidos do estômago suba de volta ao esôfago.

Modo de emprego

Tome este medicamento por via oral, com o estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após as refeições), geralmente 3 ou 4 vezes ao dia, ou conforme indicado pelo seu médico. Tomar este medicamento com o estômago vazio ajudará a reduzir a náusea / vômito. A dosagem é baseada em sua condição médica e resposta ao tratamento. Use este medicamento regularmente para tirar o máximo proveito disso. Para lembrar mais facilmente, use-o ao mesmo tempo todos os dias. Informe seu médico se sua condição persistir ou piorar.

Precauções

Antes de tomar bethanecol, informe o seu médico ou farmacêutico se for alérgico a ele ou se tiver outras alergias. Este produto pode conter ingredientes inativos que podem causar reações alérgicas ou outros problemas. Pergunte ao seu farmacêutico para obter mais informações. Você não deve usar este medicamento se você tiver certas condições médicas. Antes de usar, pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver: cirurgia recente do estômago / intestino / bexiga, problemas estomacais / intestinais (por exemplo, úlceras, bloqueios, espasmos), peritonite, obstrução da vesícula biliar, certos problemas nervosos (vagotonia), hipertireoidismo (tireóide hiperativa), doenças pulmonares (por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica ou DPOC), problemas cardíacos (por exemplo, doença da artéria coronária, batimentos cardíacos lentos), convulsões, doença de Parkinson, problemas de pressão arterial. Antes de usar este medicamento, informe o seu médico ou farmacêutico sobre o seu

histórico médico. Este medicamento pode causar tonturas. Não conduza, use máquinas ou realize qualquer atividade que requer alerta, até ter certeza de que pode realizar essas atividades com segurança. Limite o consumo de bebidas alcoólicas. Durante a gravidez, use este medicamento quando necessário. Fale com o seu médico sobre os riscos e benefícios. Não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico antes de amamentar. Informe o seu médico ou farmacêutico sobre o seu histórico médico. Este medicamento pode causar tonturas. Não conduza, use máquinas ou realize qualquer atividade que requer alerta, até ter certeza de que pode realizar essas atividades com segurança. Limite o consumo de bebidas alcoólicas. Durante a gravidez, use este medicamento quando necessário. Fale com o seu médico sobre os riscos e benefícios. Não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico antes de amamentar. Informe o seu médico ou farmacêutico sobre o seu histórico médico. Este medicamento pode causar tonturas. Não conduza, use máquinas ou realize qualquer atividade que requer alerta, até ter certeza de que pode realizar essas atividades com segurança. Limite o consumo de bebidas alcoólicas. Durante a gravidez, use este medicamento quando necessário. Fale com o seu médico sobre os riscos e benefícios. Não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico antes de amamentar. Durante a gravidez, use este medicamento apenas quando necessário. Fale com o seu médico sobre os riscos e benefícios. Não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico antes de amamentar. Durante a gravidez, use este medicamento apenas quando necessário. Fale com o seu médico sobre os riscos e benefícios. Não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico antes de amamentar.

Interacciones con otros medicamentos

Es posible que su médico o farmacéutico ya tenga conocimiento de cualquier posible interacción con otros medicamentos y lo esté supervisando para detectarla. No empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. Antes de usar este medicamento, informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos de venta con y sin receta médica/productos herbales que esté utilizando, especialmente: medicamentos antihipertensivos (por ejemplo, mecamilamina). Este medicamento puede interferir con ciertas pruebas de laboratorio (incluyendo niveles de amilasa/lipasa), lo que podría producir resultados falsos de las pruebas. Asegure que el personal de laboratorio y todos sus médicos sepan que usted usa este medicamento. Este documento no menciona todas las posibles interacciones. Por lo tanto, antes de usar este producto, informe a su médico o farmacéutico de todos los productos que esté usando. Lleve consigo una lista de todos sus medicamentos y compártala con su médico y su farmacéutico.

Efectos secundarios

Puede causar mareos, aturdimiento, náuseas, vómitos, calambres/dolor abdominales, diarrea, aumento de la salivación/orina, sudoración, sofocos, ojos llorosos o dolor de cabeza. Informe lo antes posible a su médico o farmacéutico si cualquiera de estos efectos persiste o empeora. Si está sentado o recostado, levántese despacio, para reducir los mareos y el aturdimiento. Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque ha determinado que el beneficio para usted es mayor que el riesgo de sufrir los efectos secundarios. Mucha gente que usa este medicamento no presenta efectos secundarios graves. Notifique de inmediato a su médico si presenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios poco probables pero graves: desmayos, frecuencia cardíaca acelerada, dolor abdominal intenso. Busque atención médica de urgencia si presenta el siguiente efecto secundario que rara vez ocurre pero es muy grave: dificultad para respirar. Es raro que se produzca una reacción alérgica muy grave a este medicamento. Sin embargo, busque atención médica de urgencia si presenta cualquiera de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: erupciones de la piel, picazón/inflamación (especialmente en cara/lengua/garganta), mareos intensos, dificultad para respirar. Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota otros efectos no mencionados anteriormente. En los Estados Unidos - Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. En Canadá - Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a Salud Canadá (Health Canada) al 1-866-234-2345.

Dosis omitida

Si omite una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Si se acerca la hora de la siguiente dosis, no use la dosis omitida y siga con su régimen de dosificación. No duplique la dosis para ponerse al día.

Sobredosis

En caso de presentar síntomas graves de sobredosis, como pérdida del conocimiento o dificultades para respirar, llame al 911. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones. Los residentes de EE.UU. pueden llamar a su centro local de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar a un centro provincial para el control de intoxicaciones. Entre los síntomas de una sobredosis se incluyen dolor estomacal/abdominal, sofocos, mayor salivación, sudoración, náuseas, vómitos.

Notas

No comparta este medicamento con nadie.

Almacenamiento

Guarde este producto a temperatura ambiente, entre 15 y 30 grados C (59 y 86 grados F), protegido de la luz y la humedad. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas. No deseche medicamentos en el inodoro ni en el desagüe a menos que se lo indiquen. Deseche apropiadamente este producto cuando se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite. Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación de desechos para obtener mayor información sobre cómo desechar de forma segura su medicamento.

Fotografías por concentración del medicamento

Haga clic en el enlace "Fotografías" para ver las fotografías de muestra de la concentración de un medicamento en particular.

Concentraciones comunes

bethanechol chloride 10 mg tablet	*Fotografías 
bethanechol chloride 25 mg tablet	*Fotografías 
bethanechol chloride 5 mg tablet	*Fotografías 
bethanechol chloride 50 mg tablet	*Fotografías 

***Las ilustraciones son de muestra solamente.** Es probable que no se muestren todas las fotografías del medicamento. Su medicamento puede verse diferente. Si tiene alguna pregunta, consulte con su farmacéutico(a).

Nota importante

CÓMO USAR ESTA INFORMACIÓN: Este es un resumen y NO contiene toda la información disponible de este producto. Esta información no garantiza que este producto sea seguro, eficaz o apropiado para usted. Esta información no es una consulta médica individualizada y no pretende sustituir la opinión médica de su profesional sanitario. Siempre consulte a su profesional sanitario para obtener información más completa sobre este producto y sus necesidades sanitarias específicas.

Última actualización julio, 2016. Copyright(c) 2016 First Databank, Inc.

Tirado do **NATIONAL DRUG DATA FILE (NDDF)**, as informações incluídas são licenciadas e protegidas por direitos autorais pela First DataBank, Inc., 2012. Este material com direitos autorais foi baixado de um provedor de informações autorizado.

O objetivo desta informação é complementar, não substituir, a experiência e a opinião do seu profissional de saúde. Você deve consultar seu profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento, mudar sua dieta ou iniciar ou interromper qualquer tratamento.

© Kaiser Permanente, 2017
