

Norepinefrina

Indicação

O Hemitartarato de norepinefrina é usado no controle da pressão sanguínea em certos estados hipotensivos agudos, caracterizados por pressão arterial demasiado baixa, como em feocromocitomectomia, simpatectomia, poliomielite, infarto do miocárdio, septicemia, hipotensão causada por transfusão sanguínea e reações a medicamentos. Além disso, também é utilizado como auxiliar no tratamento da parada cardíaca e hipotensão profunda.

O hemitartrato de norepinefrina deve ser administrado por um profissional de saúde e a dose depende do estado da saúde da pessoa e do tipo de tratamento empregado pelo médico.

Efeitos Colaterais

Quais os males que pode me causar?

Os efeitos adversos mais comuns que podem ocorrer com o uso deste medicamento são lesões que fazem parar ou diminuir a circulação do sangue que irriga o órgão, deficiência de oxigênio no sangue, células ou tecidos, diminuição do ritmo cardíaco, ansiedade, dor de cabeça, dificuldade em respirar e morte tecidual por extravasamento no local da injeção.

Contraindicações

Quando não devo usar?

Este medicamento não deve ser usado em pessoas que tenham alergia ao hemitartrato de norepinefrina ou quaisquer outros componentes da formulação.

Além disso, também não deve ser administrado em hipotensos por diminuição no volume sanguíneo, pessoas com trombose vascular mesentérica ou periférica ou durante a anestesia com ciclopropano e halotano.

Este medicamento também não deve ser usado por grávidas ou mulheres a amamentar.

Advertências e Precauções

O que devo saber antes de usar?

Este medicamento contém sulfitos na sua constituição podendo causar reações alérgicas.

É recomendável registrar a pressão sanguínea a cada 2 minutos até à pressão desejada e depois a cada 5 minutos, porque existe a possibilidade de ocorrer elevação excessiva da pressão sanguínea.

Mecanismo de Ação

Como funciona?

A Norepinefrina age no aumento das pressões sistólica e diastólica e em geral da pressão do pulso.

A resistência vascular periférica aumenta na maioria dos vasos sanguíneos e o fluxo sanguíneo em cada uma das artérias que irrigam o coração aumenta.

Superdosagem

O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada?

Caso ocorra superdosagem, manifestada por hipertensão arterial severa, diminuição do ritmo cardíaco, dor de cabeça intensa e diminuição da quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto, deve-se suspender o uso do medicamento e procurar imediatamente atendimento médico.

Composição

Cada ampola com 4mL contém:

Hemitartarato de norepinefrina _____ 8 mg

Excipientes _____ q.s.p. 4 mL

(Excipientes: Cloreto de sódio, metabissulfito de sódio, ácido cítrico, citrato de sódio di-hidratado e água para injetáveis).

Cada mL da solução contém 2 mg de hemitartrato de norepinefrina equivalente a 1 mg de norepinefrina base.

Laboratório

Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda.

- SAC: 0800-979 4544

Dizeres legais:

Registro MS 1.1402.0058 | Farmacêutico Responsável: Walter F. da Silva Junior CRF-GO: 5497